レジメン登録名　　GEM+CDDP療法（時間短縮版）

【適応患者】
・腎機能が十分に維持されていること（CREA値施設基準上限以下かつCLcr60mL/min以上）
・心機能が保持されていること
（心臓超音波検査にてEF60%以上など、1時間あたり500mLの補液に耐えうると期待されている場合）
・全身状態が良好であること（PS0-1）

<投与薬物>

			投与量
① CDDP	25	mg/㎡/day	＿＿＿＿mg
② GEM	1000	mg/㎡/day	＿＿＿＿mg
③ イメンド	day1、day8→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day2・day3、day9・day10→イメンド80mg1日1回午前中		

<投与法>

〔1〕	生食500mL（メイン、ルート確保）		メイン	3hr
〔2〕	生食100mL＋デキサート1.65mg 4A＋グラニセトロン3mg1A		〔1〕の側管	30min
〔3〕	生食500mL　＋　シスプラチン	0 mg	〔1〕の側管	60min
〔4〕	生食250mL		〔1〕の側管	30min
〔5〕	生食100mL　＋　ゲムシタビン	0 mg	〔1〕の側管	30min
〔6〕	生食250mL		〔1〕の側管	30min

※）マンニットールや利尿薬を必要に応じて使用。

<クール>　2週投与、1週休薬　　**3週間1クール**

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	↑ 投与							↑ 投与							↑ 休薬						
	22 ↑ 2クール目																				