

# レジメン登録名

# HD-MVAC療法

## <投与薬物>

		投与量
① MTX	30 mg/m <sup>2</sup> /day	_____ mg
② VBL	3 mg/m <sup>2</sup> /day	_____ mg
③ ADM	30 mg/m <sup>2</sup> /day	_____ mg
④ CDDP	70 mg/m <sup>2</sup> /day	_____ mg
⑤ イメンド	day2→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day3・day4→イメンド80mg1日1回午前中	

## <投与法>

メイン	側管	
輸液1500～2000mL		day0(前日)
① リナセートD500mL 10:00～	① 生食500mL(側管のメイン) 10:00～	day1
② アセトキープ3G500mL+メイロン7%20mL1A 14:00～	② 生食100mL+メトレキセト 0 mg 14:00～ ( 0.0 V)	
③ リナセートD500mL×2瓶 0:00～		
① リナセートD500mL+メトクロプラミド1A 10:00～	① 生食500mL(側管のメイン) 朝～	day2
② リナセートD500mL+メトクロプラミド1A 14:00～	② 生食100mL+グラニセトロン3mg1A 9:00～	
③ リナセートD500mL×2瓶 0:00～	③ 生食100mL+エクサール 0 mg 10:00～ ( 0.00 V)	
	④ 生食100mL+アドリアシン 0 mg 11:00～ ( 0 V)	
	⑤ 生食400mL+シスプラチン 0 mg 13:00～	
	⑥ マンニトールS300mL 16:00～	
輸液1500～2000mL		day3(翌日)

## <クール>

2週間間隔 2週間1クール

