

# レジメン登録名

# S-1+DTX療法(術後補助)

## <投与薬物>

① S-1	80 mg/m <sup>2</sup> /day	_____mg
② DTX	40 mg/m <sup>2</sup> /day	_____mg

\* S-1の初回最大投与量は1回60mg  
増量可と判断される場合は1回75mgまで増量可能

## <投与法>

<b>*1クール目</b>			
day1-14	[1] S-1	0 mg	2×朝夕食後
<b>*2~7クール</b>			
day1	[1] グラニセトロン3mg 1A+デキササート1.65mg 4A+生食50mL	0 mg	30min
	[2] 生食250mL+ドセタキセル		60min
	[3] 生食100mL (メイン)		
day1-14	[4] S-1	0 mg	2×朝夕食後
<b>*8クール~</b>			
day1-28	[1] S-1	0 mg	2×朝夕食後

注意)他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間はあける。

## <クール>

<b>*1クール目</b>	S-1 2週間投与、1週間休薬	<b>3週間1クール</b>					
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21					
S-1	→						
<b>*2~7クール</b>	day1ドセタキセル投与、S-1 2週間投与、1週間休薬	<b>3週間1クール</b>					
	ドセタキセル投与						
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21					
S-1	→						
<b>*8クール~</b>	S-1 4週間投与、2週間休薬	<b>6週間1クール</b>					
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21					
S-1	→						
	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	37 38 39 40 41 42					
	→						