レジメン登録名　　S-1＋低用量CDDP療法

<投与薬物>

		投与量
① S-1	80 mg/㎡/day	_____mg
② CDDP	25 mg/㎡/day	_____mg
③ CDDP	20 mg/㎡/day	_____mg
④ CDDP	15 mg/㎡/day	_____mg
⑤ イメンド	day1、day8、day15→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day2・day3、day9・day10、day16・day17→イメンド80mg1日1回午前中	

CDDPの推奨投与量は②。DLT発現時は③、④へ。
注意）他のフッ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間はあける。

<投与法>

day1-21 〔1〕S-1　　0 mg/day　　2×朝夕食後

day1,8,15
- 〔2〕リナセートD 500mL　　90min(メイン)
- 〔3〕生食100mL＋デキサート1.65mg 6A＋グラニセトロン3mg 1A　30min(側管)
- 〔4〕生食500mL＋シスプラチン　　0 mg　　120min(メイン)
- 〔5〕フロセミド20mg 0.5A　　シスプラチン終了後iv
- 〔6〕ソリタ-T3号500mL　　90min(メイン)

（必要に応じてアセトキープ3G500mL等翌日投与）

<クール>　　3週投与、2週休薬　**5週間1クール**