

レジメン登録名

HD-MVAC療法

<投与薬物>

① MTX	30	mg/m ² /day
② VBL	3	mg/m ² /day
③ ADM	30	mg/m ² /day
④ CDDP	70	mg/m ² /day

投与量

_____	mg
_____	mg
_____	mg
_____	mg

<投与法>

メイン	側管	
輸液1500~2000mL		day0(前日)
① リナセートD500mL 10:00~	① 生食500mL(側管のメイン) 10:00~	day1
② リナセートD500mL+メイロン7%20mL1A 14:00~	② 生食100mL+メトレキセト 0 mg 14:00~ (0.0 V)	
③ リナセートD500mL×2瓶 0:00~		
① リナセートD500mL+メトクロプラミド1A 10:00~	① 生食500mL(側管のメイン) 朝~	day2
② リナセートD500mL+メトクロプラミド1A 14:00~	② 生食100mL+グラニセトロン3mg1筒 9:00~	
③ リナセートD500mL×2瓶 0:00~	③ 生食100mL+イクザール 0 mg 10:00~ (0.00 V)	
	④ 生食100mL+アドリアシン 0 mg 11:00~ (0 V)	
	⑤ 生食400mL+ランダ 0 mg 13:00~	
	⑥ マンニトールS300mL 16:00~	
輸液1500~2000mL		day3(翌日)

<クール>

2週間間隔 2週間1クール



<特記事項>