

## レジメン登録名

## S-1+CDDP併用療法

### <投与薬物>

- ① S-1 80 mg/m<sup>2</sup>/day  
 ② CDDP 60 mg/m<sup>2</sup>/day

### 投与量

\_\_\_\_\_mg  
 \_\_\_\_\_mg

### <投与法>


Day1-21 [1] S-1 0 mg/day 2X朝夕食後

Day7 [2] ソリタT3G 2000mL 80mL/hr

- |      |                              |             |
|------|------------------------------|-------------|
| Day8 | [3] 5%Glu1500mL+10%NaCl 60mL | 4hrかけて(メイン) |
|      | [4] デカドロン1.65mg 6A+生食100mL   | 60min(側管)   |
|      | [5] グラニセトロン3mg1筒+生食100mL     | 30min(側管)   |
|      | [6] CDDP+生食400mL 0 mg        | 2hr以上かけて    |
|      | [7] 5%Glu2000mL+10%NaCl 80mL | 4hrかけて(メイン) |
|      | [8] ソリタT3G 1500mL            | 80mL/hr     |

Day9 [9] ソリタT3G 2000mL 80mL/hr

<クール> 3週S-1内服、2週休薬、day8CDDP投与 5週間1クール  
 CDDP投与



### <特記事項>

- 注意)利尿薬は必要に応じて使用。
- 注意)CDDP投与前後それぞれ1~2Lの輸液を4時間以上かけて投与する。
- 注意)他のフッ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間をあける。