

レジメン登録名

S-1+DTX療法(術後補助)

<投与薬物>

① S-1	80 mg/m ² /day	_____mg
② DTX	40 mg/m ² /day	_____mg

* S-1の初回最大投与量は1回60mg
増量可と判断される場合は1回75mgまで増量可能

<投与法>

*1クール目			
day1-14	[1] S-1	0 mg	2×朝夕食後
*2~7クール			
day1	[1]	グラニセトロン3mg 1筒+デカドロン1.65mg 4A+生食50mL	30min
	[2]	生食250mL+ドセタキセル 0 mg	60min
	[3]	生食100mL (メイン)	
day1-14	[4] S-1	0 mg	2×朝夕食後
*8クール~			
day1-28	[1] S-1	0 mg	2×朝夕食後

<クール>

*1クール目	S-1 2週間投与、1週間休薬	3週間1クール																			
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21																			
S-1	→																				
*2~7クール	day1ドセタキセル投与、S-1 2週間投与、1週間休薬	3週間1クール																			
	ドセタキセル投与																				
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21																			
S-1	→																				
*8クール~	S-1 4週間投与、2週間休薬	6週間1クール																			
day	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																				
S-1	→																				
	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42																				
	→																				

<特記事項>

注意)他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間はあける。