

レジメン登録名

S-1+CDDP併用療法

<投与薬物>


		投与量
① S-1	80 mg/m ² /day	_____ mg
② CDDP	60 mg/m ² /day	_____ mg
③ イメンド	day8→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day9・day10→イメンド80mg1日1回午前中	

<投与法>

Day1-21 [1] S-1	0 mg/day	2X朝夕食後
Day7 [2] ソリタT3G 2000mL		80mL/hr
Day8	[3] 5%Glu1500mL+10%NaCl 60mL	4hrかけて(メイン)
	[4] デカドロン1.65mg 6A+生食100mL	60min(側管)
	[5] グラニセトロン3mg1筒+生食100mL	30min(側管)
	[6] シスプラチン 0 mg +生食400mL	2hr以上かけて
	[7] 5%Glu2000mL+10%NaCl 80mL	4hrかけて(メイン)
[8] ソリタT3G 1500mL	80mL/hr	
Day9 [9] ソリタT3G 2000mL		80mL/hr

<クール>

3週S-1内服、2週休薬、day8CDDP投与 5週間1クール



<特記事項>

注意)利尿薬は必要に応じて使用。

注意)CDDP投与前後それぞれ1～2Lの輸液を4時間以上かけて投与する。

注意)他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間をあける。