

レジメン登録名

XELOX療法(C法)

C法: 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
 治療切除不能な進行・再発の胃癌

<投与薬物>

- ① O-LHP 130 mg/m²/day _____ mg
- ② CAP 2000 mg/m²/day _____ mg

*カペシタビン投与量目安

体表面積	1日用量(錠数)
1.36m ² 未満	2400mg(8錠)
1.36以上1.66未満	3000mg(10錠)
1.66以上1.96未満	3600mg(12錠)
1.96以上	4200mg(14錠)


*ゼローダの手足症候群予防
 ゼローダ投与開始と共に
 ・保湿剤(ヘパリン類似物質)を1日5回以上塗る
 ・VB₆(ピドキサル)60mg/日を連日投与
 (ゼローダ休薬期間中も)

*状態により適宜増減してください

<投与法>

- day1 { [1] グラニセトロン3mg 1筒+デカドロン1.65mg 6A+生食50mL 30min
 [2] 5%Glu500mL+デカドロン1.65mg 1A+エルプラット 0 mg 120min
 day1夕~15朝 [3] ゼローダ錠 0 mg 2×朝夕食後

<クール> 2週間投薬、1週間休薬 3週間1クール(クール上限なし)



<特記事項>

注意)他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間をあける。